

### Objectifs du PRSP :

Axe II – OG 2 - OS 3 et 4

### Périmètre de l'indicateur :

Mortalité – Santé mentale

### Mode de recueil de l'information :

#### Sources :

Décès : INSERM CépiDc – Populations régionales et départementales : INSEE – Population des ZSP : estimations 2000 et 2005 réalisées par l'INSEE – Population des ZSP du bassin hospitalier de Grenoble : les effectifs ont été répartis dans les 3 ZSP en respectant la répartition de la population au recensement de 1999.

Codes CIM10 : X60-X84

#### Modalités de collecte et de calcul :

Données INSERM et INSEE disponibles à l'ORS – Estimations de populations des ZSP transmises par la DRASS  
Taux comparatifs réalisés avec standardisation directe sur l'âge (âge quinquennal) – Population de référence : France métropolitaine au RGP 1999.

### Déclinaison géographique :

France – Rhône-Alpes – Départements – ZSP

### Période concernée :

Disponibilité annuelle des données de mortalité (année n-3)

Calcul de l'indicateur :

- au niveau national et régional : annuel
- au niveau départemental : sur 3 ans
- au niveau des ZSP : sur 6 ans

### Limites et biais :

Sous-estimation globale de l'ordre de 20% essentiellement chez les personnes âgées (suicides non repérés ou non enregistrés comme tels sur les certificats de décès). Homogénéité géographique de cette sous-estimation à discuter.

Retard de disponibilité des données.

Le suicide est un reflet très partiel de la souffrance psychique.

Décalage temporel entre les actions de prévention primaire et l'impact sur les suicides. Décalage plus réduit par contre pour les actions de prévention secondaire (repérage de la crise suicidaire notamment).

### Remarques – Voies d'amélioration – Perspectives :

Délai de disponibilité en voie d'amélioration. Disponibilité en année n-2 espérée à court terme.

### Proximité avec :

#### Loi de santé publique de 2004 :

Objectif 92 : réduire de 20 % le nombre des suicides et passer en 2008 à moins de 10 000 décès par an en France (indicateur régional : taux standardisé de mortalité par suicide)

**Volet correspondant du SROS 3 :** Psychiatrie Santé mentale

## Résultats :

### Effectifs de décès en 2005 :

Rhône-Alpes :	Hommes : 611	Femmes : 232	Ensemble : 843
France :	Hommes : 7 801	Femmes : 2 572	Ensemble : 10 673

### Taux comparatifs\* de mortalité

	1985	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Rhône-Alpes	22,4	16,5	15,8	16,2	15,0	15,6	14,3
France	24,9	18,7	17,8	18,0	18,1	17,8	17,5

### Taux comparatifs\* annuels de mortalité par département (Période 2003-2005)

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
16,5	19,5	19,1	16,3	20,8	8,3	13,4	16,8	14,9

### Taux comparatifs\* annuels de mortalité par ZSP


Période 2000-2005

#### Les 10 ZSP aux taux de mortalité les plus faibles

*Lyon-Nord*  
*Lyon-7*  
*Lyon-Sud-Ouest*  
*Lyon-Nord-Ouest*  
*Lyon-Est*  
*Pierre-Bénite*  
*Vénissieux*  
*Saint-Priest*  
*Tarare*  
*Maurienne*

#### Les 10 ZSP aux taux de mortalité les plus forts

*Die*  
*Saint-Etienne*  
*Pont-de-Beauvoisin*  
*Belley*  
*Montbrison*  
*Romans-Saint Vallier*  
*Thonon-les-Bains*  
*Privas*  
*Roanne*  
*Montélimar*



### Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
8,1	22,1	14,0	172 %

\*Taux pour 100 000 habitants

\*\*Moyenne pondérée sur la population