

### Objectifs du PRSP :

Axe II – OG 2 – OS 3 et 4

### Périmètre de l'indicateur :

Prévalence – Santé mentale

### Mode de recueil de l'information :

#### Sources :

Patients sous traitement neuroleptique en 2007 : CNAMTS. Population couverte par le Régime Général au 31/12/2007 : CNAMTS

#### Modalités de collecte et de calcul :

Données CNAMTS fournies par l'URCAM Rhône-Alpes.

Un patient est considéré sous traitement neuroleptique à partir de trois délivrances par an d'un médicament de la classe N05A (classification EPHMRA de l'assurance maladie).

Taux comparatifs de bénéficiaires du Régime Général sous traitement neuroleptique en 2007, réalisés avec standardisation directe sur l'âge (âge quinquennal) – Population de référence : France métropolitaine au RGP 1999.

### Déclinaison géographique :

Rhône-Alpes – Départements – ZSP

### Période concernée :

Disponibilité annuelle des données de consommation de médicaments.

Calcul de l'indicateur :

- au niveau régional, départemental et des ZSP : annuel

### Limites et biais :

L'indicateur n'intègre pas les assurés dépendant d'autres régimes que le régime général, ni les assurés du régime général gérés par les sections locales mutualistes.

Le recours aux traitements neuroleptiques peut varier selon les pratiques médicales.

### Remarques – Voies d'amélioration – Perspectives :

Amélioration des fichiers de populations couvertes.

### Proximité avec :

#### Loi de santé publique de 2004 :

Objectif 92 : réduire de 20 % le nombre des suicides et passer en 2008 à moins de 10 000 décès par an en France. (indicateur régional : taux standardisé de mortalité par suicide) – Pas d'indicateur de morbidité retenu

**Volet correspondant du SROS 3 :** Psychiatrie Santé mentale

## Résultats :

### Nombre de patients sous traitement neuroleptique en Rhône-Alpes en 2007

Hommes : 34 589 Femmes : 37 779 Ensemble : 72 368

### Taux comparatifs\* de patients sous traitement neuroleptique par département en 2007

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
13,8	16,7	14,1	13,8	16,4	14,1	14,9	11,1	14,1


### Taux comparatifs\* de patients par ZSP en 2007

#### Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

Thonon-les-Bains  
Ecully  
Annecy  
Mont-Blanc  
Roussillon  
Maurienne  
Saint-Julien en Genevois  
Vienne  
Tarentaise  
Villefranche-sur-Saône

#### Les 10 ZSP aux taux les plus forts

Privas  
Saint-Etienne  
Tarare  
Chambéry  
Aubenas  
Belley  
Romans-Saint-Vallier  
Bourg-en-Bresse  
Lyon-7  
Lyon-Est



### Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
11,1	16,9	5,8	52%

\*Taux pour 1000 habitants

\*\*Moyenne pondérée sur la population